

Dipartimento di Prevenzione

U.O.C. (SPEMP) Sanità Pubblica, Epidemiologica e Medicina Preventiva

Via Amm. Staiti, 95 – Trapani

Tel. 0923543011 – Fax 092326363

Mail: epid@asptrapani.it

FAQ - Vaccinazione contro l'HPV (scuola secondaria di I grado)

1) Cos'è l'HPV e come si trasmette?

Il Papillomavirus umano (HPV) è molto diffuso e si trasmette principalmente per via sessuale, anche con contatti incompleti. Spesso l'infezione è asintomatica: chi è infetto può non saperlo e trasmetterla.

2) Cos'è il vaccino contro l'HPV? Chi può farlo?

È un vaccino inattivato che protegge da 9 tipi di Papillomavirus umano: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58. Il vaccino è somministrabile da 11 anni compiuti. È un vaccino sicuro ed efficace.

3) Da quali malattie protegge?

Previene lesioni precancerose e cancerose del collo dell'utero, vulva, vagina, ano e alcuni tumori dell'orofaringe; riduce in parte il rischio di condilomi e verruche.

4) Il vaccino contro l'HPV può causare l'infezione?

No. È un vaccino composto da alcuni particelle simil-virali (VLP), che inducono la risposta immunitaria ma che non possono causare infezioni o malattie correlate all'HPV.

5) Perché farlo a 11-14 anni e a scuola?

Perché il vaccino funziona meglio prima dell'inizio dell'attività sessuale. Inoltre, dai 15 anni è prevista una dose aggiuntiva. La scuola permette un'offerta universale, riducendo disuguaglianze e fornisce un'opportunità semplice e gradita da molti genitori, che non debbono accompagnare il figlio/a nei centri vaccinali o dai MMG/PLS.

6) È per ragazze o anche per ragazzi?

Sì, per **entrambi**. Protegge direttamente i/le ragazzi/e, contribuisce alla protezione di comunità.

7) Quante dosi servono?

- **2 dosi** per chi inizia **prima dei 15 anni** (0 e 6-12 mesi).
 - **3 dosi** se si inizia **dai 15 anni** in su (0, 1-2, 6 mesi).
- Se si salta una dose, **non si ricomincia**: ma occorre **completare** il ciclo.

8) Dove e come si somministra?

Nel **muscolo deltoide** (braccio). A scuola la somministrazione è a cura del personale sanitario ASP; in alternativa presso centro vaccinale, PLS o MMG aderenti.

9) È sicuro?

Sì. Effetti attesi **lievi e transitori** più frequenti sono dolore/rossore al sito di inoculazione, meno frequentemente febbre, stanchezza, mal di testa transitori. Eventi gravi sono estremamente **rari**, per tale motivo è un vaccino di riferimento per sicurezza ed efficacia.

10) Ci sono controindicazioni/precauzioni?

- Allergia grave (anafilassi) a componenti del vaccino (es. eccipienti) o a una dose precedente;
- In caso di **Febbre**/malattia acuta moderata-severa → si **rinvia**;
- **Gravidanza**: non indicato per assenza di studi di sicurezza; se scoperta dopo una dose, si **rimandano** le successive.

11) Raffreddore o antibiotici: si può vaccinare comunque?

Con raffreddore lieve senza febbre spesso sì; la valutazione viene eseguita durante il triage sanitario. La maggior parte delle terapie (es. antibiotici) non controindica la vaccinazione. Segnalare sempre i farmaci al triage; decide il sanitario.

12) È immunodepresso/a: può farlo?

Sì, il vaccino **non è vivo**; tuttavia schema e **tempistica** vanno valutati dal medico.

13) Interferisce con fertilità o crescita?

No. Non influisce sulla fertilità, sviluppo o pubertà.

14) Se ho il ciclo mestruale, posso effettuare la vaccinazione?

Sì, non è una controindicazione. In caso di dismenorrea o malessere associato al ciclo, si consiglia di posticipare la somministrazione.

15) È utile vaccinarsi anche quando si è più grandi?

La vaccinazione è più efficace prima del debutto sessuale, tuttavia c'è **beneficio** anche se l'esposizione potrebbe essere già avvenuta; la protezione è importante per i tipi **non ancora incontrati**.

16) È compatibile con altri vaccini?

Sì, la **co-somministrazione** è possibile secondo indicazioni vigenti. Il team sanitario consiglia caso per caso.

17) Quanto dura la protezione?

Gli studi mostrano **risposte immunitarie durature**; non sono attualmente previsti richiami di routine nelle coorti adolescenti.

18) Le ragazze vaccinate devono comunque aderire allo screening in età adulta?

Sì, lo screening è sempre fondamentale per prevenire le patologie tumorali HPV correlate. La vaccinazione non sostituisce lo screening.

18) Dopo la vaccinazione può tornare a lezione/sport?

Sì, rientro **immediato** a lezione. Per attività sportiva intensa meglio rimandare, se non si sente al 100%.

19) Cosa fare per eventuali disturbi?

Impacchi freddi sul braccio, idratazione, riposo; blando antinfiammatorio al bisogno. Per sintomi importanti o persistenti → PLS/MMG.

20) È a pagamento?

No, l'offerta gratuita è prevista per tutti i ragazzi e le ragazze a partire dagli 11 anni d'età, con gratuità estesa a vita per le donne nate dal 1996 in poi e per gli uomini nati dal 2003 in poi.

21) Serve il consenso? Come vengono gestiti i dati?

Sì: va compilato e restituito prima della seduta al docente referente. I dati sono registrati sui sistemi regionali (AVUR) e trattati secondo GDPR.

22) Se il giorno della seduta a scuola mio figlio è assente o indeciso?

Non sono previste sedute di recupero a scuola, tuttavia si potrà programmare la vaccinazione presso il centro vaccinale di riferimento.

23) A chi rivolgersi per dubbi clinici?

Al **Pediatra di Libera Scelta/Medico di famiglia** e al Medico ASP presente nel corso della seduta scolastica.